

PUBLIKACJE NAUKOWE

Activation of defense responses in cucumber and tomato plants by selected Polish Trichoderma strains.

Nawrocka J., Snochowska M., Gajewska E., Pietrowska E., Szczech M., Małolepsza U.

2011

Veg. Crops Res. Bull. 75: 105-116

pomidor, ogórek, Trichoderma, indukcja odporności

Agrest - nowym gospodarzem dla Phytophthora cactorum.

Meszka B., Bielenin A.

2011

Post. Ochr. Roślin/Prog. Plant Protection 51(3): 1184-1187

agrest, zgnilizna korzeni, występowanie, szkodliwość, zwalczanie

Alien hemipterous insects brought to Polish greenhouse with potted plants.

Łabanowski G.

2011

Aphids and other hemipterous insects 17: 101-108

pluskwiaki, roślina doniczkowa

Allozyme Polymorphism and Phylogenetic Relationships in Apis mellifera Subspecies Selectively Reared in Poland and Bulgaria.

Ivanova E., Bieńkowska M., Petrov P.

2011

Folia Biol. 59(3-4): 121-126

pszczoła miodna, Apis mellifera, różnorodność genetyczna

Alternarioza roślin kapustowatych. Część I: Charakterystyka patogena, objawy chorobowe i szkodliwość.

Nowakowska M., Niezgoda A., Kozik E.U.

2011

Now. Warz. 52: 33-40

Alternaria brassicicola, Alternaria brassicae, patogenez, czern krzyżowych, zgorzel siewek, brązowienie róż kalafiora

Analysing agriculture and rural areas in Europe: A synthesis of research programmes in 20 countries. LEI report 2011-052.

Brouwer F., Sas-Paszt L.

2011

LEI, Wageningen, Hague: 83 p.

analiza, rolnictwo, obszar wiejski

A nine year evaluation of several scab-resistant apple cultivars for organic fruit production.

Czynczyk A., Bielicki P., Mika A., Krawiec A.

2011

J. Fruit Ornament. Plant Res. 19(2): 87-97

sad, ekologia, jabłoń, parch

An inhibitor of auxin polar transport, 2,3,5-triiodobenzoic acid (TIBA), stimulates shoot growth and flowering of partially cooled tulip bulbs.

Saniewski M., Okubo H., Miyamoto K., Ueda J.

2011

Acta Hort. 886: 239-245

auksyna, TIBA, tulipany, kwitnienie

Antioxidant profile and polyphenol oxidase activities in apple leaves after *Erwinia amylovora* infection and pretreatment with a benzothiadiazole-type resistance inducer (BTH).

Skłódowska M., Gajewska E., Kuźniak E., Wielanek M., Mikiciński A., Sobiczewski P.

2011

J. Phytopathol. 159: 495-504

antyoksydanty, BTH, zaraza ogniowa, indukcja odporności, związki fenolowe

Antybakteryjne właściwości środków dezynfekcyjnych w stosunku do bakteryjnych patogenów cebuli.

Kowalska B., Smolińska U.

2011

Now. Warz. 52: 5-13

bakterie patogeniczne, cebula, dezynfektanty
