

## PUBLIKACJE NAUKOWE

The effect of methyl jasmonate and phenolic acids on growth of seedlings and accumulation of anthocyanins in common buckwheat (*Fagopyrum esculentum* Moench).

Horbowicz M., Mioduszevska H., Koczkodaj D., Saniewski M.

2009

Acta Agrobot. 62(1): 49-56

gryka zwyczajna, jasmonian metylu, kwas fenolowy, naryngeniny, wzrost siewek, antocyjany

---

The effect of mulch and mycorrhiza on fruit yield and size of three strawberry cultivars.

Frąc M., Michalski P., Sas-Paszt L.

2009

J. Fruit Ornament. Plant Res. 17(2): 85-93

truskawka, ściółkowanie, mikoryza, plon, wielkość owoców

---

The effect of salinity, mycorrhizal inoculation and compost supply on growth and flowering mealycup sage 'Blue Victory' (*Salvia farinacea* Benth).

Nowak J., Kunka M.

2009

Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 539: 551-559

mealycup sage, *Salvia farinacea*, mycorrhiza, salinity, compost, plant quality

---

The efficacy of some neonicotinoid and other new insecticides in the control of the strawberry root weevils (*Cucurionidae*) on strawberry plantations in Poland.

Łabanowska B.H.

2009

J. Fruit Ornament. Plant Res. 17(2): 211-218

opuchlak rudonóg, *Otiorhynchus ovatus*, neonikotynoidy, Actara 25 WG, Apacz 50 WG, Apacz 435 GR, Calypso 480 SC, Regenet 200 SC, fipronil, malation, chloropiryfos, zwalczanie chemiczne

---

The farm Accounting data network application in the EU; common agricultural policy and Turkey

Fidan H., Sayin C., Zmarlicki K., Ozkan B., Mencet N.

2009

Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Yayin No.5; 2009; Antalya; Turkey. 277-296"

FADN, CAP, data collection, EU and Turkey

---

The influence of canopy architecture on light interception and distribution in 'Sampion' apple trees.

Buler Z., Mika A.

2009

J. Fruit Ornament. Plant Res. 17(2): 45-52

jabłoń, formowanie, cięcie, HYTEC, Solen, Mikado, wrzeciono, wskaźnik powierzchni liściowej, światło

---

The influence of genotype on germination of apple seeds

Lewandowski M., Żurawicz E.

2009

Acta Hort. 814 vol. 1: 429-432

jabłoń, *Malus domestica*, genotyp, nasiono, kiełkowanie, stratyfikacja

---

The inhibitory effect of tropolone and hinokitiol on the growth and development of *Fusarium oxysporum* f.sp. *tulipae*.

Saniewska A., Jarecka A.

2009

Phytopathol. Pol. 50, 2008: 33-41

*Fusarium oxysporum* f. sp. *tulipae*, tropolone, hinokitiol (b-tujaplicyna), wzrost grzybni

---

The last twenty years of blackcurrant (*Ribes nigrum* L.) breeding work in Poland.

Pluta S., Żurawicz E.

2009

Acta Hort. 814 vol. 1: 309-314

porzeczka czarna, sekwencyjna analiza komponentów plonu, plon, komponenty plonu

---

The occurrence of 'Candidatus Phytoplasma asteris' in *Fraxinus excelsior* trees in Poland.

Kamińska M., Berniak H.

2009

Phytopathol. Pol. 49, 2008: 35-41

popiół, proliferacja pędu, fitoplazmy żółtaczki astra, jesion, *Fraxinus*.

---