

PUBLIKACJE NAUKOWE

Liczebność populacji szkodliwych i pożytecznych roztoczy na różnych odmianach śliwy.

Sekrecka M., Olszak R.W.

2008

Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Rośl. 48(1):131-133

śliwa, roztocze, Phytoseiidae, Tydeidae, odmiana, podkładka

Lokalizacja genów wpływających na jakość jabłek na mapie referencyjnej genomu jabłoni (*Malus domestica* Borkh.).

Keller-Przybyłkiewicz S., Korbin M.

2008

Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 16:69-82

Malus domestica Borkh., marker molekularny, CAPS, SSCP, gen, mapa genomu, jabłoń

Mączniaki rzekome - narastające zagrożenie dla upraw roślin ozdobnych.

Skrzypczak Cz.

2008

Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 529:191-194

mączniak rzekomy, roślina ozdobna, występowanie, szkodliwość

Mites (Acarina) phoretic on some common bumblebee species (*Bombus* spp.) from the Puławy area (South - Eastern Poland).

Chmielewski W., Baker R.A.

2008

J. Apic. Sci. 52(1):37-47, www.opisik.pulawy.pl

Bombus, trzmiele, roztocze, forezja, Polska

Mixed infection of dahlia plants in Poland with apple proliferation and aster yellows phytoplasmas.

Kamińska M., Śliwa H.

2008

Plant Pathol. 57(2):363

prolifracja, fitoplazma żółtaczk astra, dalia

Modyfikacja genetyczna roślin sadowniczych - kierunki, sukcesy i problemy.

Korbin M.

2008

Biotechnologia 2 (81):9-19

inżynieria genetyczna, roślina owocowa, komercjalizacja

Monitoring raspberry cane midge, *Resseliella theobaldi*, with sex pheromone traps: results from 2006.

Cross J., Baroffio C., Grassi A., Hall D., Łabanowska B.H., Milenkovic S., Nilsson T., Shternshis M.,

Torneus C., Trandem N., Vetek G.
2008
IOBC wprs Bulletin, Vol. 39:11-17
malina, monitoring, pułapka feromonowa

Możliwości chemicznej ochrony bylin przed *Phytophthora cryptogea*.
Ptaszek M., Orlikowski L.B.
2008
Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Rośl. 48(2):508-511
Phytophthora cryptogea, fungicydy, ochrona integrowana, skuteczność

Najważniejsze aspekty zdrowotności nasion roślin ogrodniczych.
Janas R
2008
Zesz. Nauk. Wydz. Ogrodn. WSE-H w Skierniewicach 7, 2007:53-60
nasiono, zdrowotność, roślina

New generation acaricides for control of two important strawberry pests: The two-spotted spider mite and the strawberry mite.
Łabanowska B.H.
2008
IOBC wprs Bulletin, Vol. 39:101-108
akarycydy, zwalczanie szkodników, truskawka
