

PUBLIKACJE NAUKOWE

Occurrence of *Phytophthora cinnamomi* on ericaceous plants in container-grown ornamental nurseries in Poland.

Orlikowski L.B., Szkuta G.

2002

J.Plant Protection Res. 42(2)2002 157-163

Phytophthora cinnamomi, izolaty, patogeny roślin

Ocena kwitnienia 80 odmian czereśni i ich klasyfikacja pod względem wczesności kwitnienia.

Hodun G., Hodun M.

2002

Ann.UMCS Lublin, Vol.X 189-194

czereśnia, odmiana, kwitnienie

Ocena kwitnienia 80 odmian śliw i ich klasyfikacja pod względem wczesności kwitnienia.

Hodun G., Hodun M.

2002

Ann. UMCS, Lublin, Vol.X 207-212

śliwa, odmiana, kwitnienie

Ocena kwitnienia 90 odmian wiśni i ich klasyfikacja pod względem wczesności kwitnienia.

Hodun M., Hodun G.

2002

Ann.UMCS, Lublin, Vol.X 201-206

wiśnia, odmiana, kwitnienie

Ocena nowych preparatów w zwalczaniu chorób porzeczki czarnej. Evaluation of new fungicides for control of blackcurrant diseases.

Broniarek-Niemiec A., Bielenin A.

2002

Zesz.Nauk.Inst.Sad. t.10: 207-210

porzeczka czarna, zwalczanie chorób roślin, zwalczanie chemiczne, fungicydy

Ocena owocowania dwóch polskich odmian porzeczki czarnej. Productivity evaluation of two Polish blackcurrant cultivars.

Gwozdecki J., Chlebowska D., Pierzga K.

2002

Zesz.Nauk.Inst.Sad. t.10 119-124

porzeczka czarna, odmiana, owocowanie

Ocena podatności odmian i gatunków róż na *Peronospora sparsa* (mączniaka rzekomego).

Wojdyła A.T., Wiśniewska-Grzeszkiewicz H.

2002

Zeszyty Naukowe AR Kraków 387 179-184

róża, odmiana, mączniak rzekomy

Ocena przydatności porzeczki czarnej do zbioru maszynowego metodą ścinania pędów z plantacji o dużym zagęszczeniu roślin uprawianych w systemie łąkowym.

Salamon Z., Laszlovszky-Zmarlicka A., Smolarz K., Cianciara Z.

2002

Inżynieria Rolnicza 13(33), 2001 442-447

porzeczka czarna, zbiór mechaniczny, pęd

Ocena reakcji mikrorozmnażanych roślin na stresy biotyczne i abiotyczne z zastosowaniem metody fluorescencji chlorofilu.

Michalczuk B., Borkowska B.

2002

Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 481 641-646

rozmnażanie roślin, fluorescencja, chlorofil

Ochrona plantacji truskawek przed chwastami przy użyciu mieszaniny herbicydów zawierającej fenmedifam, desmedifam, etofumesat i trifluralinę (Saherb 232 EC).

Lisek J.

2002

Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 42(2)2002 568-571

truskawka, herbicydy, chwasty
